

Du har fået tid til operation for åreknuder (stripning)

Operationen har til formål at fjerne den lange vene på låret og fjerne lokale åreknuder.

FØR OPERATIONEN

Det ben, der skal opereres skal være barberet helt frit for hår senest 3 dage før operationen - helst med en klipper, da en skraber beskadiger huden.

I lysken, skal kønsbehåringen på den side være fjernet - helt ind til midtlinien (dvs. inkl. den side af pungen/skamlæben). Der må ikke smøres cremer på benet før operationen, idet det øger infektionsrisikoen.

Du må ikke spise mad 6 timer før indgrebet, men må drikke klare væsker indtil 2 timer før operationen.

Hvis du har sukkersyge eller får blodfortyndende behandling, skal nærmere forholdsregler aftales.

Du må ikke tage hjertemagnyl fra 1 uge før operation til 2 dage efter operation.

OPERATIONEN

Operationen foregår i lokalbedøvelse kombineret med en rus.

Indsprøjtningen af den lokalbedøvende væske er forbundet med kortvarig smerte. Der suppleres med lokalbedøvelse under operationen.

Der gives beroligende medicin, så du føler dig døsig.

Selve operationen tager ca. en time (det er lidt forskelligt), og er ikke forbundet med smerte.

Du skal afhentes efter operationen og må ikke selv tage hjem. Bilkørsel er forbudt i mindst 12 timer. Men være påpasselig, da operation og forbindelse på især højre ben giver nedsat reaktionstid ved bilkørsel.

Da der ofte gives smertestillende medicin må du principielt ikke være alene i 24 timer efter operationen.

EFTER OPERATIONEN

Du skal hvile i klinikken lige efter operationen, så vi er sikre på, at alt er godt inden du tager hjem.

Det er vigtigt, at bevæge sig så normalt som muligt efter operationen.

Virkningen af bedøvelsen svinder i løbet af nogle timer. Herefter er sårene ømme i nogle par dage.

I de fleste tilfælde er det nok at tage et par smertestillende tabl.

Håndkøbspræparater som Panodil eventuelt suppleret med Ipren er som regel tilstrækkeligt, - tages gerne samtidigt.

Undtagelsesvis kan der sive lidt blod ud fra de opererede steder. Pres i så tilfælde et rent lommetørklæde mod såret uden på forbindingen et par min. gerne med benet løftet op på en stol. Kontakt eventuelt klinikken, hvis du er urolig.

Du skal motionere let i dagene efter operationen. Når du sidder stille, skal du anbringe benet på en skammel.

Efter 3 dage fjernes forbindingen samt plastret i lysken. Plastre på resten af benet lades i fred. Der anlægges en kompressionsstrømpe til at bære om dagen i 4-6 uger.

10-12 dage efter operationen kommer du i klinikken til fjernelse af tråde og evt. plasterstrips.

Normal tilværelse og arbejde kan for det meste genoptages få dage efter operationen.

Der kan komme hævelse og misfarvning af de opererede områder i efterforløbet, det svinder af sig selv.

Sport kan tidligst genoptages når trådene er fjernet.

Hvis der er noget, som du er i tvivl om, kan du altid kontakte os.

Længere sygemelding er sjældent nødvendig. Almindelig daglig færden genoptages når du føler dig klar til det.

RISIKO

Ikke alle patienter oplever den bedring af symptomerne de havde håbet på.

Risiko ved en åreknudeoperation er, at der kan optræde en nerveskade (et mindre, følelsesløst område, sjældnere kronisk smerter) eller infektion i et sår.

Begge dele er sjældne. Sårinfektioner kan kræve behandling.

Let blødning fra et operationssår ses indimellem, men er oftest uden særlig betydning. Blodpropper eller andre mere alvorlige komplikationer er meget sjældne.

KONTROL

Vi tilbyder kontrolbesøg med trådfjernelse efter 10-12 dage og efter 3 måneder (hvis du synes det er nødvendigt)..

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte klinikken.

Vi står til rådighed i åbningstiden for spørgsmål vedrørende forløbet efter operationen.

Får du i øvrigt akut brug for lægetilsyn, kan egen læge, lægevagt eller skadestue kontaktes.

Ved udeblivelse uden afbud opkræves honorar for udeblivelsen.