

KIRURGISK KLINIK KØGE

Behandling for mavesårsbakterier (*Helicobacter pylori*)

Behandlingsprincippet er at give syredæmpende medicin og antibiotika i 7 dage.

BEHANDLING NR 1

Der gives 7 dages behandling med

Pantoprazol 40 mg x 2

Klacid 500 mg x 2

Imadrax 1 g x 2

5 uger efter endt behandling tages via egen læge en afføringsprøve for at se om bakterierne er væk.

Senest 2 uger før afføringsprøven skal man være ophørt med at tage Pantoprazol.

BEHANDLING NR 2

I visse tilfælde anvendes en anden behandling. Den bruges som regel hvis behandling nr. 1 ikke virkede tilstrækkeligt (stadig mavesårsbakterier i afføringsprøven).

Der gives så en kur på 14 dage med

Pantoprazol 40 mg x 2

Bismuthsubsalylat 125 mg x 4

Tetracyclin 250 – 500 mg x 4

samt

Metronidazol 500 mg x 2

5 uger efter endt behandling tages hos læge en afføringsprøve for at se om bakterierne er væk.

Senest 2 uger før afføringsprøven skal man være ophørt med at tage Pantoprazol.

OBS: Undgå alkoholindtag i perioden, da der kan komme bivirkninger, som ved antabus-behandling.